

FICHA TÉCNICA DIFARAT URBANO



NOMBRE COMERCIAL: DIFARAT

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Indandionas

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Difacinona 2-difenilacetil-1,3-indandiona: **0.005%**

Bases, saborizante, edulcorante, colorante y vehículo: **99.995 %**


REG: RSCO-DOM-RODE-503-311-033-0.005

TIPO DE FORMULACIÓN: Rodenticida anticoagulante del grupo de las indandionas en formulación de bloques extrudados parafinados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Densidad 1.0107 g/cm³, color beige con ligero olor a cera y cereal, no es soluble en agua.

MODO DE ACCIÓN: Es un antagonista de la vitamina K, el principal sitio de acción es el hígado donde los precursores de los factores de la coagulación son dependientes de la presencia de la vitamina K para formarse en zimógenos pro coagulantes. El punto de acción aparenta ser la inhibición de la epoxi reductasa de la vitamina K1.

USOS AUTORIZADOS: Para el control de roedores en cordones primarios y secundarios, en zonas industriales, áreas especializadas en exteriores de industria alimentaria, construcciones urbanas y sus alrededores.



Difacinona

FICHA TÉCNICA DIFARAT URBANO



PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES DEL MODO DE USO:

Difarat® es un rodenticida anticoagulante de primera generación, elimina ratas, ratones y otras especies de roedores presentes en el ambiente industrial y urbano

Plagas	Tipo de infestación	Cantidad de extrudados parafinados esféricos por punto de cebado	Observaciones
Ratas <i>Rattus norvegicus</i> <i>Rattus rattus</i>	Ligera a moderadamente alta	1 a 3 bloques	Colocar los cebos dentro de la madriguera o en el área frecuentada por las ratas dentro de las estaciones cebadero
	Alta	4 a 8 bloques	
Ratones <i>Mus musculus</i>	Ligera a alta	16 bloques	Colocar los cebos dentro de la madriguera o en el área frecuentada por los ratones dentro de las estaciones cebadero

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Localice los sitios de alimentación, tránsito y reposo de los roedores, coloque **Difarat®** en estos lugares o en la entrada de madrigueras. Para prevenir la re infestación ocurra, limite las fuentes de alimento y agua para los roedores, tanto como sea posible. Si la re infestación ocurre, repita el tratamiento. Donde haya una fuente continua de infestación, ubique cebaderos permanentes y rellene cuanto sea necesario. Maneje el producto con guantes, colecte y elimine apropiadamente todos los animales todos animales muertos así como el cebo sobrante.

CONTRAINDICACIONES:

No se mezcle con el uso de insecticidas y no se almacene cerca de los mismos.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Página web: <http://www.tridente.com.mx>