

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Use equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (Overol completo, botas de seguridad, guantes de látex, nitrilo o vinilo).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.

LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.

- NO MANIPULE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENE EN CASA HABITACION.
- MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANÉSE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO SE MANIPULE CERCA DEL FUEGO.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS:

- Si el producto ha hecho contacto con la piel y ojos, lávese la parte afectada con agua limpia y corriente durante 15 minutos, si ha ingerido el producto, provoque el vómito administrando agua salada tibia (1 cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repita la acción hasta inducir el vómito, si la persona esta inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad y no provoque el vómito, tampoco trate de introducir nada vía oral, llame inmediatamente a un médico

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- **Grupo químico.** Anticoagulante del grupo de las indandionas, síntomas de intoxicación: la ingestión del producto puede causar dolor epigástrico, náusea, vómito, palpitaciones, cansancio, vértigo y días después hemorragias internas. Por inhalación puede causar irritación de vías respiratorias y/o hemorragia nasal. Puede absorberse por piel y causar enrojecimiento, prurito y neuralgia. En los ojos puede causar irritación temporal.
- **Antídoto y tratamiento específico:** El tratamiento debe ser sintomático administrando vitamina K1 (fitomenadiona), dosis 10 mg I.V. en adultos, 5 mg I.V. en infantes, también puede administrarse vía oral en dosificación de 15 a 25 mg para adultos y para infantes de 5 a 10 mg este producto también puede administrarse vía intramuscular 5 a 10 mg en adultos y 5 mg en infantes. Repitiendo si es necesario. Debe mantenerse bajo supervisión médica al paciente hasta que los niveles de protrombina sean normales y las hemorragias hayan cesado, la transfusión sanguínea es recomendable según el hematocrito del paciente.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, LOS LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO O RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- Este producto es ALTAMENTE tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)



**"APLICACIÓN URBANA"
"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**



difacinaona

Rodenticida anticoagulante del grupo de las indandionas en formulación de bloques parafinados

- Mata ratas y ratones
- Irresistible al olor para los roedores

- Forma y diseño del extrudado especializado

Convenido Porcentual: % EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO: Difacinaona: 2-difenilacetil-1,3 indandiona: 0.005 %

INGREDIENTES INERTES: Bases, saborizante, colorante y vehiculo: 99.995 %

TOTAL 100.000 %

Registro: RSCO-URB-RODE-503-311-033-0.005

Contenido neto: 0.014 kg



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Inglatera 37, Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 55 9183-2406, 55 9183-2407,

Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,

E-mail: tridente@prodigy.net.mx www.tridente.com.mx

USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD

INSTRUCCIONES DE USO

DIFARAT es un rodenticida anticoagulante de primera generación, elimina ratas, ratones y otras especies de roedores presentes en el ambiente urbano.

| Plagas | Tipo de infestación | Cantidad de bloques parafinados por punto de cebado | Observaciones |
|---|------------------------|---|--|
| Ratas <i>Rattus norvegicus</i> <i>Rattus rattus</i> | Ligera a moderada alta | 5 a 10 bloques | Colocar los cebos dentro de la madriguera o en el área frecuentada por las ratas dentro de las estaciones cebadero |
| | Alta | 10 a 20 bloques | |
| Ratones <i>Mus musculus</i> | Ligera a alta | 5 a 10 bloques | Coloque los cebos dentro de las madrigueras o en el área frecuentada por los ratones dentro de las estaciones cebadero |

APLICACION:

DIFARAT Este producto consiste en bloques parafinados; está indicado para el control de roedores en cordones primarios y secundarios, en zonas industriales, áreas especializadas en industria alimentaria, construcciones urbanas y sus alrededores. Localice los sitios de alimentación, tránsito y reposo de los roedores, coloque DIFARAT en estos lugares o en la entrada de madrigueras. Para prevenir la reinfestación, limite las fuentes de alimento y agua para los roedores, tanto como sea posible. Si la reinfestación ocurre, repita el tratamiento. Donde haya una fuente continua de infestación, ubique cebaderos permanentes y rellene cuanto sea necesario. Maneje el producto con guantes, colecte y elimine apropiadamente todos los animales muertos así como el cebo sobrante.

CONTRAINDICACIONES

No se mezcle con el uso de insecticidas y no se almacene cerca de los mismos.

GARANTIA:

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., garantiza la composición química del producto y sus resultados, siempre y cuando se emplee bajo condiciones normales y manejo del producto indicado en la etiqueta. Así mismo declina toda responsabilidad por daños que pudiesen resultar del uso del almacenamiento o manejo impropio del producto o de sus envases por parte del cliente.



PRECAUCIÓN

