

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Usar overol de algodón, guantes de hule y lentes de protección tipo química
- Lavarse las manos con agua y jabón después de su uso

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión, si esta consciente y no ha vomitado, provocar el vómito introduciendo un dedo por la garganta o administrando agua tibia salada
- En caso de salpicadura con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón
- En caso de salpicadura sobre la piel o los ojos, lavar con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos
- Si la persona esta inconsciente, verificar que respira sin dificultad, no provocar el vómito y no introducir nada en la boca

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO**

- Grupo químico de FORMITION TRIDENTE<sup>MR</sup>, Organofosforados
- Síntomas y efectos: Dolor de cabeza, mareos, ambliopía, debilidad, náuseas, calambres, diarrea, molestias del pecho y contracción de la pupila.
- Tratamiento: Determinar los niveles de colinesterasa hemática para confirmar diagnóstico; tratar con atropina, en adultos, aplicar sulfato de atropina vía IV de 0.2-4.0 mg, si no es posible por esta vía administrar vía IM la misma dosis, a intervalos de 15 a 30 minutos hasta atropinización completa, esta debe de ser mantenida de 2 a 12 hr. dependiendo de la severidad de la intoxicación.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOPILARLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AL CERCA DE SU CERCAÑO

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA**

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE GR. MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES DE GR. INV. Y P. BRADOS ACUÍATICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUÍATICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS. NO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LA VEGETACIÓN ESTÁ EN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. RECOMIENDA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE REGISTRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE SE DERIVEN DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

**"USO EXCLUSIVO DE JARDINERÍA"**



**diazinon**

insecticida y / o acaricida / granulado / organofosforado

**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

**Composición:**

Diazinon: 0,0-dietil 0-(2-isopropil-6metil-4-pirimidil) fosforoato..... 2.00 (p/p)  
(Equivalente a 20 g de I.A./Kg)

Diluyentes y compuestos relacionados ..... 98.00

Registro: RCGC 1A-1A-120-323-005-02

Peso neto: 1 Kg

**PRECAUCIÓN**

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO POR LA PIEL  
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**



Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

**FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**

Heriberto Frias 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.  
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,  
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

**INSTRUCCIONES DE USO**

FORMITION TRIDENTE<sup>MR</sup> es un insecticida de uso en jardinería para el control de las plagas aquí indicadas

Nombre común	Nombre científico	Dosis g/m <sup>2</sup>	Forma de aplicación
Hormiga arriera o cuatalata	<i>Atta spp.</i>	20 g	A la boca de hormiguero, una sola aplicación o repetir si se nota actividad
Hormiga brava	<i>Solenopsis geminata</i>		
Hormiga de fuego	<i>Solenopsis xyloni</i>		
Grillo de campo	<i>Arctia de b. s. s.</i>	20 g	Aplicar al suelo cuando se note actividad
Careo de tunic	<i>Stenopelmatus talpa</i>	20 g	Localizar los montículos de entrada y hacer la aplicación directa
Gusano trozador	<i>Agrotis spp</i>	20 g	Aplicar al suelo cuando se note actividad

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** De persistir la actividad de la plaga repetir la dosis indicada por el fabricante.

**TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA:** No hay un tiempo debido al tipo de aplicación del producto.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Quitar la banda de seguridad, retirar la tapa de plástico que protege la parte superior del envase, después retirar el sello con el logo de TRIDENTE, de este modo ya esta listo para usarse como si fuera un salero.

**MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO:** FORMITION TRIDENTE<sup>MR</sup> es un producto formulado listo para usarse y su aplicación no requiere de equipo especializado, FORMITION TRIDENTE<sup>MR</sup> puede ser aplicado directamente esparciendo uniformemente en el lugar de su aplicación o con fertilizadora manual cuando es aplicado a campos de golf, campos deportivos o áreas ornamentales.

Para el caso de control de hormigas basta con utilizar un recipiente y colocar la cantidad de producto recomendado y esparcirlo uniformemente en el área de actividad de las hormigas.

**CONTRAINDICACIONES:** No hay alguna indicación al respecto, dado su uso en jardinería.

**PRECAUCIÓN**