

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

- Evítese comer, beber o fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lávese con agua abundantemente.
- Utilícese equipo de protección adecuado para su aplicación: overol y guantes.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

- En caso de ingestión provóquese el vómito cuando el paciente esté consciente introduciéndole un dedo en la garganta. Alternativamente y a criterio médico se sugiere el lavado gástrico.
- En caso de ingestión accidental por mascotas provóquese inmediatamente el vómito, lleve al animal con el médico veterinario y muéstrele esta etiqueta.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo Químico del producto: Indandiona

Signos y síntomas de intoxicación: inapetencia, cansancio apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión se presentan hemorragias cutáneo-mucosas y mehaturia, dolores abdominales y de espalda, epistaxis, hemoptisis, hematomas y manifestaciones purpúreas de la piel.

Antídoto y tratamiento específico: Administrar vitamina K₁.

Dosis adultos: 40 mg/día en varias formas.

Dosis niños: 20 mg/día en varias formas.

El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protrombina y niveles de hemoglobina.

Recomendaciones al médico veterinario: los signos en los animales intoxicados son similares a los del humano, se recomienda administrar vitamina K₁ a la dosis de 5-10 mg/kg durante 3 semanas.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE, SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRANDO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCAÑO."

"GARANTÍA"
SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C. V., garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.



587UR-2

Product Code: 65230



"USO AGRÍCOLA"

V E S E R I S

**RODENT
CAKE**

Difacinona
Rodenticida / Bloque parafinado
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% en peso
DIFACINONA: (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg.)	0.005
INGREDIENTES INERTES: Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul.	99.995
TOTAL:	100.000

No. de Registro: RSCO-RODE-0503-304-033-0.005

CONTENIDO NETO: 8.17 kg



**NOCIVO EN CASO DE INGESTION
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

**Importado y distribuido por:
SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL**

DE PLAGAS, S.A. DE C.V.
Villa Primavera No. 640 Int. 3
Col. Villas de Lindavista, C.P. 64540
Monterrey, Nuevo León.
R.F.C. SEC 910827 4P0
Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893
www.pestweb.com.mx
contacto@pestweb.com.mx

Formulado Por:



Bell
LABORATORIES, INC.

3699 Kinsman Blvd.
Madison, WI 53704 U.S.A.
www.bellabs.com

"Hecho En E.U.A."

PRECAUCIÓN

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"

Utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

ALMACENES Y BODEGAS			
	GRADO DE INFESTACIÓN	NO. DE BLOQUES/ PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Rata	Ligera a moderada severa	1-3 16	Colóquese la cantidad de cebo indicado por punto o directo a madriguera cada 5 a 10 m.
Ratón		1	Colóquese 1 bloque por punto cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.
CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>)			
	GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: kg/ha	NO. DE BLOQUES/ PUNTO DE CEBADO
	8 - 15%	2kg	1 a 2 bloques
	Mayor 15%	3kg	2 a 3 bloques
Aplicase la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación y ubíquese donde el roedor busca en forma natural su alimento, protegiendo los bloques del paso de maquinaria e implementos agrícolas, personas y animales no objeto de control. Preferentemente en el sitio más distante del surco para proteger los cebos de las inundaciones cada 5 a 10 metros de distancia o directo a la madriguera. Colóquese o aplique el cebo al inicio de cada ciclo o posterior al riego por los menos 2 veces al año.			
MAÍZ (<i>Zea Maiz</i>) SORGO (<i>Sorghum vilgare</i>) TRIGO (<i>Triticum spp</i>) AVENA (<i>Avena sativa</i>) ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)			
	GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: kg/ha	NO. DE BLOQUES/ PUNTO DE CEBADO
	LIGERA	1 a 2 kg	1 a 2 bloques
	MODERADA	2 a 3 kg	2 a 3 bloques
	SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 3
Aplicase la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa.			
TRIGO, AVENA Y ARROZ Aplicase la cantidad de cebo requerida de la misma forma que en el cultivo del maíz. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa o macollo (arroz).			
JITOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>) PEPINO (<i>Cucumis sativus</i>)		LECHUGA (<i>Lactuca sativa</i>) SANDÍA (<i>Cucurbita citrulus</i>)	
MELÓN (<i>Cucumis melo</i>) CALABAZA (<i>Cucurbita pepo</i>)			
	GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: kg/ha	NO. DE BLOQUES/ PUNTO DE CEBADO
	LIGERA	1kg	1 bloque
	MODERADA	2kg	2
	SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 3
Aplicase la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo 4 o 5 semanas antes de la fecha de cosecha. El uso de cebaderos o de tubos facilita el control del cebo y permite a los roedores continuar el consumo.			

(SIL) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Inmediata.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Determinese los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspecciónese las áreas tratadas al tercer día repóngase el cebo consumido. Manténgase una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. Posteriormente replácese el tratamiento a intervalos semanales, hasta que descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños para prevenir reinfestaciones establezcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación replácese el tratamiento.

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta® incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se repitan

reinfestaciones continuas, colóquese cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario. Inscribese sobre los cebaderos la leyenda: PRECAUCIÓN RODENTICIDA.

CONTRAINDICACIONES

Este producto es un cebo de aplicación directa. Manéjese los cebos con guantes. No se deben mezclar con insecticidas o ningún otro producto, para evitar el rechazo de cebo por los roedores.

"MANEJO DE LA RESISTENCIA"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."

082120/01-14

