



240 mm

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (overol, botas, guantes, lentes y mascarilla de protección respiratoria).

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION”.
- “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

- “PRIMEROS AUXILIOS”:
- En caso de inhalación llévese al paciente al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos enjuáguese con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón.
- En caso de ingestión consúltese al médico inmediatamente. Manténgase al paciente abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión del producto por animales domésticos consulte al médico veterinario

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Llada sin costo 01 800 00 928 00
01 55 5598-859 / 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DÍAS DEL AÑO

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: insecticida piretroide.
ANTÍDOTO ESPECÍFICO: no existe antídoto específico.
SIGNOS Y SÍNTOMAS: por sobreexposición oral e intoxicación con el producto se pueden presentar taquicardia, náusea, temor muscular, vértigo.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO: en caso de ingestión se sugiere lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere en la intoxicación con piretroides, la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

“MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE”
- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DISECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA”.

- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTÍA:
Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando este haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

“INSTRUCCIONES DE USO”

“¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!”

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN Y LOS TRABAJADORES: evítese la aspersión de este producto en presencia de personas y animales domésticos. Utilícese el equipo de protección recomendado. Antes de iniciar la aplicación de este producto, adviértase sobre la protección de los enseres de cocina y su posterior lavado.

MODO DE EMPLEO: Icon® 10 CS es una novedosa formulación, un microencapsulado que se mezcla con agua y que aplicada a diferentes sustratos en interiores o exteriores logra residualidad prolongada hasta por 9 meses en base a la tecnología iCAP® de las microcápsulas. Los insectos y arácnidos se intoxican por contacto e ingestión al quedar adheridas las microcápsulas a sus cuerpos y transportarlas a sus sitios de refugio, sirviendo así de vehículo de intoxicación para sus congéneres, asegurando que cada insecto o arácnido que pase o se pose en el área tratada lleve dosis suficiente para intoxicarlo e intoxicar a mas congéneres.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Esta formulación presenta fácil suspensibilidad en agua, por lo que no requiere el premezclado. Para realizar la mezcla del producto realice los pasos siguientes:

- Verifique que su equipo, incluyendo la boquilla, este limpio y sin residuos de otros productos.
- Calibre previamente el gasto por minuto de su equipo.
- Mida en el dosificador del envase o en una probeta la cantidad de producto necesario para la dilución recomendada de acuerdo al uso y plaga de la tabla.
- Agregue al tanque del equipo la mitad de agua requerida utilizando una malla fina como filtro.
- Vacíe la dosis de Icon® 10 CS al tanque del equipo
- Finalmente agregue el resto de agua, filtrada de y mezcle homogéneamente agitando el equipo
- Verifique que no presente fugas antes de presurizar y realizar la aplicación.

Icon® 10 CS se puede aplicar con diferentes equipos y técnicas:

- Aspersión residual con bomba manual
- Aspersión residual con motomochila

Consulte el instructivo para cada plaga, técnica de aplicación y uso relacionado en esta etiqueta: ver tabla de dosificación

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aspersión residual con bomba manual, aplíquese cada 6 a 9 meses.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: si el producto fue aplicado por aspersión ventile en área y tratada es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES: el contacto con sustancias de reacción alcalina puede inactivar el producto. Verifique siempre la calidad del agua a utilizar. No se mezcle con otros plaguicidas en el mismo equipo de aplicación.

“APLICACION URBANA”



syngenta.

**lambda cyhalotrina (cyhalotrina)
Insecticida y/o Acaricida Piretroide
Suspensión encapsulada**

“COMPOSICION PORCENTUAL” % EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

lambda cyhalotrina (cyhalotrina): Alfa-Ciano-3-fenoxibencil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato, a 1:1 de los isómeros (Z) – (1R, 3R), S-ester y (Z) (1S, 3S)-R-ester 9.7
(Equivalente a 102 g de i.a./L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, surfactante, estabilizadores, antiespumante, conservador, solvente, vehículo y diluyente 90.3

TOTAL 100

CONTENIDO NETO: 1 L

REG.: RSCO-URB-INAC-177-306-408-10

® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.



NOCIVO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO:

Syngenta Agro, S.A. de C.V
Eje 130 # 125

Col. Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.

Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V
San Lorenzo No. 1009

Col. Del Valle, 03100, México, D.F.

Tel: (55) 9183 9100

“HECHO EN BELGICA”

Los nombres de producto que contienen ® o TM, el logo de Syngenta y el marco CP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

LOTE:

FABRICACION:

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación

175 mm

Al preparar o mezclar

Después de aplicar



PRECAUCION