

Selección de color más



39.5cms.

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto. Use ropa protectora, zapatos o botas y guantes para uso exclusivo del trabajo y que no se lleven puestos después de éste.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrela la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos 15 minutos con agua potable.
- Si hubo contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto **no provoque el vómito**.

RECOMENDACIONES AL MEDICO, Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
 Lada sin costo 01 800 00 928 00
 01 (55) 55 598-6659 / 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Hidroxicoumarinas.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Talon Bloques Parafinados al ser ingerido por seres humanos, puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y producir hematomas y/o hemorragias.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:

Administre vitamina K1. **Dosis adultos:** 40 mg/día en varias tomas. **Dosis niños:** 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales y la hemorragia haya cesado.

MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO".
- "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES), ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y ALGAS".

GARANTIA:

Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

Talon Bloques Parafinados



“APLICACION URBANA”

Talon® G

Rodenticida

syngenta.

<i>Brodifacoum/ Hidroxicoumarinas</i>	<i>Rodenticida</i>	<i>Bloques parafinados</i>	<i>Hidroxicoumarinas</i>
COMPOSICION PORCENTUAL			% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

brodifacoum: 3-[3-(4'-bromo (1'-1'-bifenil)-4-yl)-1,2,3,4- tetrahydro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona.

(Equivalente a 0.05 gramos de i.a./Kg)

INGREDIENTES INERTES:

Emético, adherentes, atrayentes, colorantes y vehiculo

0.005

99.995

TOTAL 100

CONTENIDO NETO: 1 kg

REG.: **RSCO-URB-RODE-501-320-033-0.005**

® Marca Registrada de una Compañía

del Grupo Syngenta.

TITULAR DEL REGISTRO:

Syngenta Agro, S.A. de C.V

Eje 130 # 125

Col. Zona Industrial del Potosí

78090 San Luis Potosí, S.L.P.

Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V

San Lorenzo No. 1009

Col. Del Valle, 03100

México, D.F.

Tel: (55) 9183 9100

“HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

Los nombres de producto que contengan ® o TM, el logo de Syngenta y el marco OP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

“INSTRUCCIONES DE USO”

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN INSTALACIONES URBANAS:

1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retire todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Revise semanalmente los puntos de cebado y reemplazarlos cuando sea necesario.
4. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
5. Conforme aparezcan los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimento y de las fuentes de agua.
6. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar reinfestaciones.
7. **Talon bloques parafinados** no causan recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.
8. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
9. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
10. El número y tamaño de los cebaderos a usar dependerá de la severidad de la infestación.
11. Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras.
12. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente.
13. Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.
14. Es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
15. No aplique en presencia de niños y animales domésticos y evitar su ingreso posterior al área tratada.
16. Después del tratamiento, retire todo resto de cebo y recipientes utilizados.

Talon bloques parafinados contiene 10 ppm de "BITREX", sustancia amarga preventiva de ingestión humana accidental.

PRESENTACIÓN	PLAGA	INFESTACION ALTA	INFESTACION BAJA
Talon Bloques Parafinados	RATA / RATON	2 Bloques cada 3 a 5 metros	1 Bloque cada 5 a 10 metros

EN INSTALACIONES URBANAS, DOMÉSTICAS, DE JARDINERÍA E INDUSTRIALES

CONTRAINDICACIONES: No aplique en presencia de niños y animales domésticos.

Al aplicar



PRECAUCION

Después de aplicar



TC 0612 221 379

12 cms.