

Selección de color más



39.5cms.

“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto. Use ropa protectora, zapatos y guantes para uso exclusivo del trabajo y que no se usen después de éste.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES.”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO.”
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION.”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BARRERSE Y PONGASE ROPA LIMPIA.”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.”

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.”

“PRIMEROS AUXILIOS”:

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lívelos por lo menos 15 minutos con agua potable.
- Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto, no provoque el vómito.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO.” Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX 01 800 00 926 00 01 5598-6959 / 5811-2634 SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO
--

GRUPO QUIMICO: Hidroxicoumarinas.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Talon Pellet al ser ingerido por seres humanos, puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y producir hemorragias.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: Administre vitamina K1. **Dosis adultos:** 40 mg/día en varias tomas. **Dosis niños:** 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles se estabilicen y la hemorragia haya cesado.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:


- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (SCM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”
- “EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE. Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO.”
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMIFEROS Y AVES). ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS).

GARANTIA:

Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, se haya utilizado en especies diversas de las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

“APLICACION URBANA”



Talon Pellets

Rodenticida



Brodifacoum / Hidroxicoumarinas	Rodenticida	Pellets
“COMPOSICION PORCENTUAL”		% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Brodifacoum: 3-[3-(4-“bromofenil-4-ii)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicoumarina [Equivalente a 0.05 g de l.a./kg]

0.005

INGREDIENTES INERTES:

Disolvente, Agentes de palatabilidad, Colorante, Agente de aversión, Portador

99.995

TOTAL 100

REG.: RSCO-URB-RODE 501-313-057-0005

© Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

CONTENIDO NETO: 1 kg

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION y/o POR EL CONTACTO CON LA PIEL

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V.
San Lorenzo No. 1009
Col. Del Valle, 03100, México, D.F.
Tel: (55) 9183 9100

DISTRIBUIDOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V.
San Lorenzo No. 1009
Col. Del Valle, 03100, México, D.F.
Tel: (55) 9183 9100

LOTE:

FABRICACION:

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

“HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”

“HECHO EN INGLATERRA”

“HECHO EN GRECIA”

“HECHO EN SUIZA”

“ENVASADO EN MEXICO”

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

Los nombres de producto que contengan ® o TM, el logo de Syngenta y el marco CP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

RECOMENDACIONES:

1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retire todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Mantenga los cebos protegidos de la humedad y la intemperie.
4. Revise semanalmente los puntos de cebado y adicione producto cuando sea necesario.
5. Reemplace completamente el cebo contaminado o dañado (moho, humedad, calor, hormigas etc).
6. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
7. Al aparecer los roedores muertos, recójalos y entérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimento y fuentes de agua.
8. Mantenga algunos puntos de cebado permanentes para evitar re infestaciones.
9. Talon Pellet no causa recole al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.
10. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo de la cantidad consumida, estado físico y edad del roedor.
11. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
12. Se recomienda el uso de Talon Pellet en áreas de interiores.

Talon Pellet contiene 10 ppm de “BITREX”, sustancia amarga preventiva de ingestión humana accidental.

METODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO:

1. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
2. El número y tamaño de los puntos de cebado a usar dependerá de la severidad de la infestación de los roedores.

RECOMENDACIONES

USO	PLAGA	INFESTACION ALTA	INFESTACION BAJA
Industria alimenticia Industria hotelera Hospitales. Casa habitación Escuelas. Aeropuertos Restaurantes.	RATA (<i>Rattus rattus</i>) (<i>Rattus norvegicus</i>)	50 g/5 metros	25 g/5 a 10 metros
	RATON (<i>Mus musculus</i>)	20 g/2 metros	10 g/3 a 5 metros

FRECUENCIA DE APLICACION

Hacer aplicaciones cada siete días o a intervalos más cortos dependiendo del grado de infestación del roedor.

CONTRAINDICACIONES:

No aplique en presencia de niños y animales domésticos.

Al preparar o mezclar



PRECAUCION

Después de aplicar

