

"ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"
CAPTOR 300 es un atrayente alimenticio, no requiere de precauciones ni advertencias especiales para su uso, se deben adoptar las medidas precautorias indicadas del insecticida con el que se mezcla.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
 - "NO TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
 - "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
 - "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
 - "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
 - "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
 - "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
 - "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BÁÑESE Y PONGÁSE ROPA LIMPIA"
 - "NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"
 - "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
 - "NO DESTAPE LA BOCUILLA CON LA BOCA"
 - "EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"
 - "PRIMEROS AUXILIOS"
- En caso de contacto con la piel y los ojos es suficiente con lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido, no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua.

"RECOMENDACIONES AL MEDICÓ"

En caso de malestar deberá remitirse a las recomendaciones de la etiqueta del insecticida con el que se mezcla. Captor 300 está catalogado como un producto no tóxico. No requiere de antidoto ni tratamiento específico. Adopte medidas sintomáticas en caso de alergia en personas susceptibles.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO PROFUNDEE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y REEMPLAZAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO"
- "REDUCE EL TIEMPO DE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DEL ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN"

"USO AGRÍCOLA"



CAPTOR 300

ATRAYENTE

Proteína hidrolizada

Atrayente alimenticio para control de moscas de la fruta.

Solución Acucosa.

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	% (p/p)
INGREDIENTE ACTIVO:	
PROTEÍNA HIDROLIZADA: Aminoácidos derivados de la hidrólisis de proteínas vegetales	33%
(Equivale a 360 grs. de l.A./litro a 20°C)	
EQUIVALENTES INERTES:	
Solventes (agua) y conservador	67%

Registro: RSCO-ATRA-0702-304-013-033

Contenido neto: 20 lts

PRECAUCIÓN

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad:
Lote:

PROMOTORA AGROPECUARIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

Insurgentes Sur No. 269, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, México. D.F. Tel: 01 55 5584-5558; Fax: 01 55 5584-5218
Correo electrónico: grupopausamx@yahoo.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Captor 300 se usa para la detección y control de moscas de la fruta, a través del trapeo y mediante aspersiones terrestres y aéreas en mezcla con agua y con insecticidas específicos y autorizados por la COFEPRIS.

DOSES:

Para el trapeo: 250 ml de mezcla por trampa.

Método para preparar el producto: En un recipiente mezclar 10 ml de Captor 300, 5 grs. de Bórax pentahidratado, 12 ml propilenglicol y 223 ml de agua. Poner el contenido de la mezcla en cada trampa y cambiar cada 7 días.

En aspersiones terrestres: Aplicar 150-300 ml por árbol en la parte soleada en manchas circulares, de la parte media a la parte alta de la copa.

En hileras altas:

Método para preparar el producto: En un recipiente mezclar 10 ml del insecticida específico generalmente Malathion 500 o Malathion 1000, 40 ml de Captor 300 y 950 ml de Agua.

En aspersiones aéreas: Aplicar 1 litro de mezcla por hectárea en franjas alternas.

Método para preparar el producto: En un recipiente mezcla 1 litro de Malathion Ultra bajo Volumen y 4 litros de Captor 300.

Las aplicaciones tanto en aspersiones terrestres como en aspersiones aéreas de deben realizar cada 7 días.

Intervalo entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo: Seguir lo establecido en la etiqueta del insecticida con que se mezcla.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Seguir lo establecido en la etiqueta del insecticida con que se mezcla.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

INCOMPATIBILIDAD: La eficacia del CAPTOR 300 puede ser afectada cuando se combina o se aplica sobre fungicidas cúpricos.

"MANEJO DE RESISTENCIA"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN E IMPLEMENTE LOS OTROS MÉTODOS DE CONTROL (CULTURAL, MECÁNICO Y BIOLÓGICO)"