

FICHA TÉCNICA DIABLOQUAT MAX



NOMBRE COMERCIAL: DIABLOQUAT MAX

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Bipiridilos + Ureas

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): **Paraquat:** Sal dicloruro del ion 1,1-dimetil-4,4' bipiridilio "Con un contenido del ion bipiridilio no menor de 72.4%" **27.60** + **Diuron:** N(3,4-Diclorofenil)-N,N-Dimetil Urea **10.00**

(Equivalente a 200 + 100 g de i.a./L)

Humectante, dispersante, antiespumante, anticongelante y diluyente, no más de 62.40%


REG: RSCO-MEZC-1229-307-008-038

TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida/ Suspensión acuosa

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido; Densidad relativa 1.12 g/mL.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida sistémico y de contacto, de acción pre y post emergente a la maleza. Por su acción sistémica posee cierto efecto residual.

USOS AUTORIZADOS: Se recomienda su uso en los cultivos de limón, mandarina, naranja, toronja y lima.



Paraquat + Diurón



FICHA TÉCNICA DIABLOQUAT MAX

MALEZAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Estrellita (*Gallisonga parviflora*), Malva (*Urocarpidium jacens*), arrocillo (*Paspalum paniculatum*).

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	MALEZAS	
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Limón, mandarina, naranja, toronja y lima	1.50-3.0	Estrellita	<i>Gallisonga parviflora</i>
		Malva	<i>Urocarpidium jacens</i>
		Arrocillo	<i>Paspalum paniculatum</i>

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el producto

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicar, debe diluir el producto en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico y agregue la cantidad recomendada de DIABLOQUAT MAX, agite utilizando un material adecuado (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en agitación mientras se aplica. En aspersiones terrestres utilizar de 200 a 300 L de agua por hectárea. No se recomienda su uso en aplicaciones aéreas. Puede usarse en herbicación.

Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguillón del pulverizador esté ajustado a la altura suficiente como para garantizar la cobertura total de la maleza.

Para tener resultados óptimos al aplicar **DIABLOQUAT MAX**, se recomienda tener buena humedad en el suelo, condiciones atmosféricas adecuadas (clima templado, húmedo y el cielo despejado) y que el follaje de la malea no esté mojado (por rocío, lluvia o riego).

DIABLOQUAT MAX puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de las malezas. Se recomienda usar la dosis alta para tratar las malezas densas o como primer tratamiento. Usar las dosis bajas para las aplicaciones en los sitios muy sembrados o para tratar los rebotes. De preferencia, aplicar cuando las malezas son jóvenes y tienen menos

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA DIABLOQUAT MAX




de 14 centímetros de altura. En los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos, se debe cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco o a los tallos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con vientos arriba de 8 km/h. No aplicar más de 5 L por hectárea en un año. No aplicar en horas de calor intenso. Evitar que la aspersion toque el follaje del cultivo por proteger. Evite aplicar cerca de los cultivos susceptibles. No tratar variedades enanas de árboles frutales. Debido a uno de los ingredientes activos (Diurón), **DIABLOQUAT MAX** puede tener efecto prolongado en el suelo, por lo que deben transcurrir 2 años antes de rotar el cultivo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.

INCOMPATIBILIDAD: Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. Para la mezcla con otros productos, se recomienda utilizar aquellos con registro sanitario vigente para los cultivos aquí recomendados.



Paraquat + Diurón