

FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

REG. RSCO-URB-INAC-115-302-
009-35

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo: **P/P**
CLORPIRIFOS ETIL: 0.0-dietil 0-(3,5,6-
tricloro-2-piridinil) fosforotioato
Equivalente a 400 g.de i.a./L a 20°C
No menos de34.60%

Ingredientes Inertes:
Estabilizadores, Emulsificantes y solventes.
No más de.....65.40%
Total:.....100.00%

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN****PRECAUCIÓN**

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA
DE SALUD**

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO:** Los aplicadores y personas que
manejen el producto deben usar el equipo
de protección personal adecuado como
camisa de manga larga, pantalones largos,
calcetines con zapatos o botas resistentes
al agua. Se recomienda utilizar un overol
sobre la ropa, que cubra los guantes y

botas para evitar infiltración del producto al
cuerpo. Los guantes que dan mayor
protección en el manejo de productos
químicos agrícolas son los nitrilo, butilo y/o
neopreno. Usar goggles o mascarilla
protectora durante la aplicación, así como
gorra o sombrero de plástico. Durante la
preparación y aplicación del producto
hágala a favor del viento. No coma, beba o
fume durante el manejo y aplicación. No
destape la boquilla con la boca. Al terminar
las labores descontamine el equipo de
aplicación, quítese el overol y colóquelo en
un lugar ventilado, la ropa utilizada durante
la aplicación debe lavarse con agua y jabón
y póngase ropa limpia.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO
DEL PRODUCTO:**

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ
UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE
JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS,
EN LACTANCIA Y ANIMALES
DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE
UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE
CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL
EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA
BOCA”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN
MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO
CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN
TRONCO DE MADERA U OTRO MATERIAL”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO,
BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL
CONTACTO CON LOS OJOS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL
PACIENTE CON EL MÉDICO Y
MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE
APLICACIÓN

EXTREMIS® 40 ECNA es una nueva formulación inodora, basada en el ingrediente activo Clorpirifos, que se utiliza para combatir insectos en el interior de la casa y en su exterior, en oficinas, hoteles,

supermercados y restaurantes y sus bodegas, así como estructuras similares.

EXTREMIS® 40 ECNA es una fórmula única con solventes no volátiles, basada en ingredientes naturales en lugar de los solventes volátiles que contienen otros productos.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	OBSERVACIONES
Cucarachas	Cucaracha alemana <i>Blatella germanica</i> Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i> Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i>	14 ml/ 1 L de agua	Fuera y dentro de la casa o área con infestación. Tratamiento localizado debajo de lavaderos, refrigeradores, esquinas, closets, grietas y hendiduras.
Hormigas	Hormigas <i>Lasius niger</i> <i>Solenopsis</i> sp. <i>Monomorium pharaonis</i>	14 ml/ 1 L de agua	Fuera y dentro de la casa. Tratamiento localizado. Se recomienda hacer una segunda aplicación en dos semanas, dejar sin aplicación un promedio de dos meses y en volver a iniciar el programa.
Grillos, mosquitos y arañas	Grillos <i>Acheta domesticus</i> Mosquito del paludismo <i>Anopheles</i> spp Mosquito de la fiebre amarilla <i>Aedes</i> spp Mosquito común <i>Culex</i> spp Arañas <i>Latrodectus mactans</i> <i>Lycosa</i> spp	14 ml/ 1 L de agua	En la casa y terreno aledaño. Se recomienda hacer una segunda aplicación en dos semanas, iniciar el programa cada dos meses.
Termitas, escarabajos de la madera	Termita subterránea <i>Reticulitermes</i> spp <i>Zootermopsis</i> spp <i>Heterotermes</i> spp <i>Coptotermes</i> spp	1 L/ 50 L de agua	Tratamiento localizado. Se recomienda hacer una nueva aplicación preventiva en un año.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Cucarachas: Se recomienda hacer una segunda aplicación a los tres meses en caso de observar la presencia de cucarachas, en caso contrario volver aplicar a los seis meses para mantenimiento y control de la plaga.

Hormigas: Se recomienda realizar una segunda aplicación en dos semanas, volver a iniciar el programa cada dos meses.

Grillos, mosquitos y arañas: En infestaciones severas, realizar una segunda aplicación en dos semanas, después realizar una aplicación mensual para mantenimiento.

Termitas y escarabajos de la madera: Realizar la aplicación preventiva cada año.

TIEMPO DE REENTRADA

Para aplicación en interiores, el tiempo de reentrada es de 30 minutos después del rociado, pasado este tiempo, ventilar el área por una hora para poder pasar a las áreas tratadas. Para aplicaciones en

exteriores se podrá ingresar a las áreas tratadas cuando pasen 30 minutos.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Mezclar la dosis indicada en el cuadro de recomendaciones en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una emulsión homogénea. Utilice equipo de aplicación profesional con el tamaño de boquillas adecuadas. Lavar el envase vacío tres veces, añadiendo agua al envase, agitándolo vigorosamente y depositando el agua dentro del equipo aplicador y complete el volumen con agua. Mantenga la aspersora en constante agitación para la adecuada mezcla del producto.

Control de cucarachas y hormigas

Aplicar en la casa, debajo de lavabos, fregaderos y refrigeradores, en armarios, en los rincones, en grietas y hendiduras en paredes y en baldosas del piso y en las inmediaciones de casas y edificios donde puedan ocultarse las cucarachas y hormigas.

Control de termitas subterráneas**• Previo a la construcción**

Tratamiento antes de enlazar: Pulverizar el suelo con la solución, en dosis de 4 litros por metro cuadrado y cubrir con polietileno antes de verter el hormigón.

Perforar hoyos en la periferia de los cimientos hasta una profundidad de 30 cm y a distancias uniformes. Inyectar la solución preparada en dosis de 5 litros por metro lineal. Tapar los hoyos con tierra.

• Después de la construcción

Cimientos y estructuras: Aplicar en el perímetro de los cimientos perforando hoyos de 30 cm de profundidad y a unos 15 cm de los cimientos a distancias uniformes. Obturar los hoyos con la tierra al finalizar la aplicación.

Dentro de la residencia: Aplicar a lo largo de la base de las paredes y de muros de soporte. Aplicar alrededor de las tuberías de desagüe. Inyectar la solución preparada en grietas y hendiduras en los cimientos del edificio.

Control de termitas y escarabajos de la madera

El tratamiento se efectúa mediante la perforación de pequeños orificios en los marcos de puertas y ventanas y en otras estructuras de madera en la casa. Luego se inyecta la solución preparada en los orificios, que serán obturados después de la aplicación.

En porches, depósitos y garajes: Aplicar en pilotes de madera y en los postes telefónicos y eléctricos, cercanos a la estructura.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar el producto cuando haya viento (mayor a 15 Km/hr), ni en horas de calor intenso.

No aplicar el producto en mezcla con otros plaguicidas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso

Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la persona está CONSCIENTE lave la boca con buches de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio o magnesio) a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Si la persona está INCONSCIENTE no le provoque el vómito, no trate de introducirla nada en la boca; acueste al paciente cuidando que la boca y la nariz estén libres de obstáculos y colóquelo en un lugar fresco y bien ventilado, lejos del área de contaminación.

Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada. Si el paciente no respira proporcione de inmediato la respiración artificial. No aplicar respiración de boca a boca cuando el paciente haya tragado producto o tenga contaminada la cara.

Si se absorbió por piel: Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado

Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Organofosforado.

Signos y Síntomas de Intoxicación:

Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, mareo, náuseas, vómitos, calambres, opresión torácica.

En estado grave: Contracción de la pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, pérdida de conciencia, convulsiones, edema pulmonar, pérdida de control de esfínteres, asfixia por paro respiratorio.

Tratamiento Antídoto, Sulfato de Atropina.

En Intoxicación leve: En adultos, aplicar una ampolla (1.0 mg) en forma Intramuscular o subcutánea cada 2-3 horas según respuesta. En el caso de niños 0.05 mg de sulfato de atropina/kg de peso cada 2 a 3 horas según respuesta.

En caso de intoxicación de moderada a severa: Para adultos una ampolleta (1.0 mg) en forma intramuscular cada 10 – 15 minutos según respuesta, hasta secar mucosas orales. En niños 0.05 mg/kg de peso en forma intramuscular o subcutánea cada 10 – 15 minutos según respuesta, hasta secar mucosas orales.

Antídoto toxogonin: Este antídoto se aplica en el caso de intoxicaciones severas en donde la aplicación del sulfato de atropina no es suficiente. Aplicar en forma intravenosa toxogonin 6 – 8 mg / kg de peso, diluido en 250 ml de solución fisiológica y pasarlo en 30 – 60 minutos cada dos a tres horas por cuatro dosis. En niños el médico deberá valorar su equilibrio hídrico y diluir de acuerdo a su peso corporal. Están contraindicados el uso de morfina, epinefrina. No administrar sulfato de atropina a una persona cianótica.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 009280; 01(55) 5598 6659 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASE VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL

PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA

MAKHTESHIM AGAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR:

MAKHTESHIM AGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
POTRERILLOS No. 6
COL. PARQUE INDUSTRIAL
NEZAHUALCÓYOTL
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 57810
TEL: (55) 5113 2606
FAX: (55) 5113 2631

DISTRIBUIDOR:

QUIMIX, S.A. de C.V.
Av. Central 206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
México D.F. Tel. 52-78-46-80

HECHO EN ISRAEL, ENVASADO EN MÉXICO

●.....●
16.03.12