

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LA FORMA AQUI RECOMENDADA



Fertilizante Foliar o al Suelo / Sólido

INGREDIENTE ACTIVO	COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
Nitrógeno (N)		20.740%
Fósforo (P ₂ O ₅)		33.100%
Potasio (K ₂ O)		11.090%
Boro Sol. Agua		0.030%
Boro Sol. Acido		0.020%
Magnesio (Mg)		0.023%
Hierro (Fe)		0.030%
Zinc (Zn)		0.030%
Cobre (Cu)		0.021%
INGREDIENTES INERTES:		34.916%
		Total: 100.000%

Registro: RSCO-0328/XI/98 Vigencia: INDETERMINADA Contenido Neto 1 Kg.

" PRECAUCION "

FLOREN 20-30-10 TRIDENTE, es un producto Ligeramente Tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".

No. de Lote:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
Heriberto Frías No. 1529-703 Col. Del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
Conmutador: 0155-9183-2400 ventas: 9183-2406/07/08
Lada sin costo: 01 800-2025-017
E-mail: tridente@prodigy.net.mx

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad:



LIGERAMENTE TOXICO

**ALTO, LEA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use equipo de protección para realizar con seguridad la aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, bañese y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese perfectamente la parte afectada con agua limpia.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL
PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE
ESTA ETIQUETA"**

RECOMENDACIONES AL MEDICO

SINTOMAS DE INTOXICACION.-

No es tóxico, al menos que se ingiera en forma intencional.

TRATAMIENTO Y ANTIDOTO.-

No existen. En caso necesario proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE.-

No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento general de la ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE.-**

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

AGROQUIMICA TRIDENTE.-

Garantiza que este producto está compuesto por los ingredientes que se especifican, limitando nuestra garantía a la reposición del producto. No damos garantía expresa ni implícita con respecto a los resultados que se obtengan por el uso que se haga con este producto.

INSTRUCCIONES DE USO

¡ SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION !

FLOREN 20-30-10 TRIDENTE, es un fertilizante ultrasoluble especialmente elaborado para usarse en fertirrigación y en aspersión foliar. Es un producto libre de Sodio y Cloruros, ideal para incluirlo como parte de los programas de nutrición vegetal, sobre todo durante las etapas de desarrollo de los cultivos, hasta la floración. Su fórmula 20-30-10 + microelementos promueve un vigoroso desarrollo de raíces, tallos y hojas, creando las reservas que las plantas necesitarán en la etapa de floración y cuajado de frutos.

MODO DE EMPLEO PARA FERTILIZACION FOLIAR		
CULTIVOS	DOSIS POR HA	APLICACION
PAPA	2 A 4 kg.	Iniciar las aplicaciones a los 20 días después de la emergencia, hasta la formación de estolones.
HORTALIZAS DE CORTE Tomate, chile, pepino, melón, sandía.	2 A 5 kg.	Realizar aspersiones cada 7-10 días a partir del trasplante hasta la aparición de botones florales.
ALGODÓN Y SOYA	2 A 5 kg.	A partir de los 25 días de la emergencia, cada 15 días hasta la formación de botones florales.
CITRICOS Limón, naranja, toronja, mandarina.	400 a 800 gr. Por cada 100 lts. de agua.	A partir de los 25 días de la emergencia, cada 15 días hasta la formación de botones florales.
FRUTALES CADUCIFOLIOS Manzano, peral, nogal.	300 a 600 gr. por cada 100 lts. de agua.	A partir de la brotación hasta finales de primavera cada 20-30 días.
ORNAMENTALES	200 a 500 gr. por cada 100 lts. de agua.	Asperjar durante la etapa de crecimiento vegetativo.

Para aplicación terrestre utilizar 200 a 400 lts. de agua/ha.

Para aspersión aérea, 40 a 80 lts. de agua/ha.

Para frutales, 1000 a 200 lts. de agua/ha.

MODO DE EMPLEO PARA FERTIRRIGACION		
CULTIVO	DOSIS kg./Ha SEMANAL	EPOCA DE APLICACION
PAPA	15-30	A partir de los 20 días después de la emergencia hasta la formación de tubérculos.
HORTALIZAS DE CORTE Tomate, chile, melón, pepino, calabacea.	10-20	Después del establecimiento de la plántula hasta la formación de botones florales.
CITRICOS Naranja, Toronja, mandarina.	10-20	Al iniciar la brotación vegetativa hasta la floración.
FRUTALES CADUCIFOLIOS Manzano, nogal, ciruelo, peral.	15-30	Al iniciar la actividad del árbol, hasta finales de la primavera.

RECOMENDACIONES.-

La dosis total por semana deberá repetirse en partes iguales en el número de riegos que se realicen en dicha semana. Estas recomendaciones son muy generales, ya que las dosis deberán ajustarse de acuerdo a la fertilidad del suelo, clima exigencias nutritivas y potencial de rendimiento en cada caso particular.

REENTRADA A CAMPOS TRATADOS.-

Pueden entrarse a los campos tratados sin ropa protectora tan pronto seque la aspersión de 1 a 2 horas.

INCOMPATIBILIDAD.-

Floren 20-30-10 TRIDENTE, es compatible con la mayoría de insecticidas.

FITOTOXICIDAD.-

Este producto no causa fitotoxicidad, siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

